



# Perfil epidemiológico de pacientes que tentaram suicídio no Brasil

## Epidemiological profile of patients who attempted suicide in Brazil

Mércia Aleide Ribeiro Leite<sup>\*1</sup>  
Fabiana Aparecida Nogueira<sup>\*2</sup>  
Gabriela Carmo de Melo<sup>\*2</sup>  
Isabella Rodrigues Alves Paiva<sup>\*2</sup>  
Marcele Caroline Cândida Santos<sup>\*2</sup>  
Raquel Cristina Teixeira da Silva de Miranda<sup>\*2</sup>  
Suellen Cristina Gomes da Silva<sup>\*2</sup>  
Tiago Aguiar Pinali<sup>\*2</sup>

### Objetivo

Descrever o perfil epidemiológico dos pacientes que tentaram suicídio, no Brasil, no período de 1980 a 2009, de acordo com a faixa etária, gênero, métodos utilizados e fatores de risco.

### Metodologia

Trata-se de um artigo de revisão de literatura cuja base de dado consultada foi a Scielo. Para seleção dos artigos foram estabelecidos os seguintes critérios de inclusão: artigos publicados, em português, no período de 2000 a 2010, que se referiam a humanos, adultos, dos sexos masculino e feminino.

---

<sup>1\*</sup> Docente do Departamento de Enfermagem da PUC Minas – *campus* Coração Eucarístico.

<sup>2\*</sup> Acadêmicas de Enfermagem pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Belo Horizonte - Minas Gerais.

2

## Resultados

Ainda que a taxa de suicídio entre os mais velhos seja a mais alta, um crescente aumento das taxas no grupo com idade de 20 a 59 anos tem sido observado em ambos os gêneros. A proporção entre taxa de suicídio e gênero indica fortemente uma maior mortalidade entre os homens. Embora as mulheres sejam propensas a tentar o suicídio mais vezes, os homens têm êxito mais freqüente. Isto sugere que os homens têm uma intenção de morte mais forte e, assim, tendem a usar métodos mais letais. Embora os transtornos mentais estejam associados a mais de 90% de todos os casos de suicídio, esse evento também pode ser resultado de fatores culturais, sociais, ambientais, fisiológicos, genéticos e biológicos.

## Conclusão

É necessária uma maior discussão entre as pessoas sobre os fatores de risco e as formas de identificar na população pessoas com comportamento suicida, com o intuito de prevenir o surgimento de novos casos. É importante ainda, uma abordagem efetiva pela equipe de saúde, às pessoas que tentaram suicídio, uma vez que elas estão passando por um momento delicado de não valorização da vida e de baixa auto-estima.

**Descritores:** Suicídio; Tentativa de suicídio; Perfil de saúde.

**Descriptors:** Suicide; Suicide, Attempted; Health Profile.